Lecture 14 | 중간고사 대비보강

* SVD의 보강설명. → 시험에 안나옴. 안심.
* MLE의 유도과정. → 시험에 안나옴. 안심.

SVD. 오늘 설명안함. → Principal Component Analysis 주성분 분석. (PCA)
기대가 된다면 설명을 드림에.

MLE: likelihood → 얼마나 일어날법하냐. 확률값.

Gaussian, sample → mean 값을 추정.



$N(x; \mu, \sigma^2)$
모르는 값.

10개 sample = {1.2, 1.8, 2.1, 1.7, 2.5, 3.2, 1.8, ...}
10개 값.

⇒ Likelihood

$L(\mu)$

~~$\mu \in \mathbb{R}$~~

$\mu \in \{\mu_1, \mu_2, \mu_3\}$
↓ 후보군들

sample이 일어날 관측될 확률.
= μ_1하에 sample이 관측될 확률



곱하겠다
Σ 더하겠다.

$p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{k=1}^{n} p(x_k)$

$\prod_{k=1}^{3} k = 1 \times 2 \times 3$

$\sum_{k=1}^{3} k = 1 + 2 + 3$

$$\mathcal{L}(\mu_1) = \prod_{n=1}^{10} N(x_n; \mu_1, \sigma^2)$$

$$\mathcal{L}(\mu_2) = \quad \mu_2$$

$$\mathcal{L}(\mu_3) = \quad \mu_3$$

$\mu \in \{\mu_1, \mu_2, \mu_3\}$

평균이 μ_1일때 sample이 관측될 확률



continuous.



$N(x; \hat{\mu}, \sigma^2)$ = 가우시안 가능도.

μ = 연속, 실수.

μ = ? MLE. $\mathcal{L}(\mu)$ max

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N}\sum x_n$$ 평균

수학 개념 → 지반강의 유도과정. (시험 X)

likelihood

정의. $$\mathcal{L}(\mu) = \prod_{n=1}^{N} N(x_n; \mu, \sigma^2)$$

log-likelihood를 씀.

$\log \mathcal{L}(\mu)$

$$\arg\max_{\mu} \mathcal{L}(\mu) = \arg\max_{\mu} \log \mathcal{L}(\mu)$$



log = 단조증가함수.

max value

arg max $\mathcal{L}$

arg max log $\mathcal{L}$

함수값

입력값 = 같은 위치에서 최대

$\mathcal{L}$, log $\mathcal{L}$

$\log \mathcal{L}(\mu)$ 이점 : ① 독립 = 곱 → 합

$\log x \cdot y = \log x + \log y$

② 확률분포가 exp 형태 → 지수함수.

→ log를 통해 지수없앰.

실제 시스템

~~공대~~, 이과계열과, 고등학교 $\log_{10} = \log$, 대학교 $\log_e = \ln$

~~공대~~, 이과계열과, 대학교 $\log_{10}$, $\log$

$$\mathcal{L}(\mu) = \prod N(x_n; \mu, \sigma^2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \propto \exp(\cdot) = e^{(\cdot)}$$

(·)가 복잡할수록

$\log$ = 자연로그

$$\times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_2-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

e

$$\times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_3-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\vdots$$

$$\log \mathcal{L}(\mu) = \sum_{n=1}^{N} \left\{ \log \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} - \frac{(x_n-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

$$N(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}}$$

$$\log N(x; \mu, \sigma^2) = \left(\log \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) + \log_e e^{-\{\ \}}$$

$$= -\frac{1}{2}\log 2\pi\sigma^2 - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

$\log L(\mu) = N \cdot \log \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} - \sum_{n=1}^{N} \frac{(x_n-\mu)^2}{2\sigma^2}$

$= -\frac{N}{2}\log 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu)^2$

min
max

미분 $=0$ 인 값 중에, min/max가 있을 수도 있다.



극소값 $f(x) = (x-a)^2$

극소값 $\frac{d}{dx}f(x) = 0$

$2(x-a) = 0 \Leftrightarrow x = a$

극값

$\frac{d}{d\mu}\log L(\mu) = 0$

상수

$= \frac{d}{d\mu}\left\{-\frac{N}{2}\log 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu)^2\right\}$

$= -\frac{1}{\sigma^2}\sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu)$ $\quad \mu = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}x_n$

$= 0$

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu) = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{N} x_n = N\mu$

SVM

Support Vector, ← 도움이 되었나요?

SVM = 학습데이터의 일부를 가지고 계산

SVM → convex optimization → Lagrangian dual problem

↓

KKT condition 해가 만족하는 조건

↓

Support vector. (등호가 되는 데이터들이다. complementary slackness)

$a_n \times 0 = 0$; complementary slackness.

prediction = $\sum a_n t_n k(x_n, x)$ + ...

등호가 되어서 $a_n = 0$ 인

$a_1 = 0 \rightarrow x_1 =$ ~~SV~~

$a_n \neq 0 \rightarrow x_2 =$ SV

primal problem: $\max f_0(x)$ s.t. $f_i(x) \geq 0$. (f_0, f_i convex)

$\mathcal{L}$ → dual problem: $\min_{\lambda} \max f_0(x) + \lambda_i f_i(x)$ s.t. $\lambda_i \geq 0$

λ → multiplier.

SVM.

primal problem: max (minimum 마진)

s.t. (모든 샘플이 margin 밖에 있도록) // 주어진 w, b로 결정된 boundary에 대하여 가장 가까이 위치한 샘플과의 거리

$\max \left\{ \min \frac{1}{\|w\|} t_n (w^T \phi(x) + b) \right\}$

s.t. $t_n (w^T \phi(x) + b) \geq 0$ 모든 sample이 자기영역에 들어갔다.

hard margin



linear model

$w^T \phi(x) + b$

$w \in \theta$

$\phi(x) \in X$ feature

b bias $\in \theta_0$

$\Leftarrow$ linear model $\theta^T x + \theta_0$



$w^T \phi(x) + b \geq 0$

$t_n \in \{-1, 1\}$

$\frac{t_n(w^T\phi(x)+b)}{\|w\|}$

○ $\max \left\{ \min \frac{1}{\|w\|} t_n(w^T\phi(x)+b) \right\}$

s.t. $t_n(w^T\phi(x)+b) \geq 0$.

지시함수이용 복잡 Bishop책.

s.t. $t_n(w^T\phi(x)+b) \geq \min \{t_n(w^T\phi(x)+b)\}$ (+강하게.) (margin보다.)

> 0



등가 동일한 결과인데 표현을 다르게 바꾸는 부분. +@ 복잡 차.

$\text{margin} = \min \frac{t_n(w^T\phi(x)+b)}{\|w\|}$ → normalize $\triangleq 1$

○ $\max \frac{1}{\|w\|}$, s.t. $t_n(w^T\phi(x)+b) \geq 1$ → dual.

$\min \frac{1}{2}\|w\|^2$

K-means

(lecture 7에서 K-means Advanced에서 performance metric으로 나오는 inertia 만나요.

Inertia = mean squared distance

Supervision = 감독, 지시

ML
- Supervised learning method ①
- Unsupervised ... ② clustering



● centroid, 평균

"Voronoi tesselation"



① Inertia = 평균 (16개의 거리 / 한 샘플과 레이블 가진 centroid 사이 거리 / 데이터 (8개) 가지 / 평균 ... 레이블 가진 데이터 (8개) 가지 / 평균 centroid 사이 거리)²

② Inertia = 평균 (——— / — (8개) 가지 / — cent. — / 레이블 데이터 (8개) — / — cent. —)²



performance index 지표.

SVM: Gaussian kernel의 γ와 그 영향

$$K(\underline{x}, \underline{x}') = \exp(-\gamma \|x - x'\|^2)$$

주어진 두 벡터에 대하

두 벡터 사이의 거리.

$$= \exp\left(-\frac{\|x - x'\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

$\exp(-x^2)$

$= \frac{1}{e^{x^2}}$

$\exp(-10x^2)$

$= \frac{1}{e^{10x^2}}$

x	1	2	3	4
$\exp(-x^2)$	$\frac{1}{e}$	$\frac{1}{e^4}$	$\frac{1}{e^9}$	$\frac{1}{e^{16}}$
$\exp(-10x^2)$	$\frac{1}{e^{10}}$	$\frac{1}{e^{40}}$	$\frac{1}{e^{90}}$	$\frac{1}{e^{160}}$

분모 ∧ 분모 ∨ 분수 γ 2배 ∧ 크다

σ^2 더 많이 더 높



$\|x - x'\|^2$